Spécificités du traitement pharmacologique du trouble bipolaire en cas de grossesse

...

Des recos @la pratique !

Dr Aude TRIFFAUX-GHESQUIERES

Responsable du CRSPP

(Centre de Ressources et de Soins en Psychiatrie Périnatale)

Hospitalisation Temps Plein parents-bébés, Hôpital de jour, CMP, Equipe Mobile

Pôle de Pédopsychiatrie 67 102

EPSAN Etablissement Public
de Santé Alsace Nord

Un acteur majeur du dispositif de santé mentale dans le Bas-Rhin

Centre de Ressources
et de Soins en Psychiatrie
Périnatale

CRSPP

Recos périnatal' AFPBN 2022/23

La Société
Marcé
Francophone

RECOS : Quelle prise en charge des troubles de l'humeur chez les femmes en âge de procréer – Pr L SAMALIN, JNPN 2022, Paris

SYNTHESE :

- L'ensemble du panel d'experts a souligné, chez les femmes en âge de procréer, l'importance de:
 - Prendre en considération le **risque tératogène des thérapeutiques envisagées**
 - Fournir une **information complétée et éclairée (voir documentée) à la patiente mais également au partenaire**
 - De **réaliser une consultation pré-conceptionnelle** en cas de projet de grossesse
- Nécessité de mettre en perspective ces recommandations aux caractéristiques individuelles de chaque patiente

Consultation CICO (Consultation d'information, de conseil et d'orientation) - Paris

= proposer à **toute femme présentant un trouble psychiatrique, enceinte ou ayant un projet de grossesse, une consultation** menée de concert par un psychiatre et un pédopsychiatre. (...) Ces femmes viennent, à la demande d'un professionnel de santé (...), seules ou avec leur compagnon, et sont reçues plus d'une heure pour leur **donner le temps d'expliquer** leurs attentes, **leurs inquiétudes** aussi, **qui reposent souvent sur la prise de psychotropes pendant la grossesse et l'allaitement**. Nous nous appuyons alors sur la littérature la plus récente ainsi que sur les recommandations du crat (Centre de ressources sur les agents tératogènes) pour proposer le traitement le plus adapté en tenant compte des expériences antérieures de la patiente et de l'avis de son psychiatre référent.

Dispositif CPC au sein du CRSPP

CRSPP @EPSAN-Brumath

UPB La Parenthèse

HDJ parents-bébés La Frimousse

CMP psy périnat

EM psy périnat

Mission d'appuis-ressources

CPC

CPC @l'EPSAN : dispositif original inspiré des CICO

→ psy périnat' + psychopharmacien

En pratique :

- Questionnaire en amont de la consultation, envoi mail, renvoi avant la CPC
- Déroulé de la cs/checklist/relevé des indicateurs pdt la cs
- Courrier à l'ensemble des partenaires + copie au couple
- Suivi post-CPC : appel tel (délai à convenir), SF EM référente de parcours psy périnat, grossesse et post-partum, cs systématique proposée au 4^{ème} et 8^{ème} mois de grossesse

En pratique ... Mme L

- RDV CPC :
 - Mme L. 41 ans et son conjoint
 - Désir d'un 1^{er} enfant pour le couple (FIV par don d'ovocytes)
 - Adressage psy lib
- **ATCD : bipolarité perso et familial (mère)**

Mme L – anamnèse bipolarité

Différents

- APA (rispéridone, aripiprazole, clozapine)
- Thymorégulateurs (lithium, lamotrigine)
- Méthylphénidate
- +/- BZD

Derniers tt stabilisants :

Lithium + aripiprazole + méthylphénidate

Stabilité psychique relative & refus des tt

Nécessité de reprise d'un tt thymoR ?
- Quel moment ?
- Quel tt ?
- Risque de décompensation périnat ?

Risques liés au tt pdt G :
Dvpt foetus, malformations ?

Questionnement parental
Qualité des interactions

Informations :

- Ensemble du dispositif de soin psy périnat
- Possibilité étayage/soutien à la parentalité

Préconisations :

1/ Traitement

- LTG + dosages plasmatiques réguliers (pbs → allaitement) : efficacité préventive relative / phase maniaque
- Lithium si décompensation (rapport B/R)
- Vigilance effets dépressogènes progestatifs / FIV
- Donormyl®/Cariban® (nausées / tr sommeil)

2/ Suivi psy

- Poursuite du suivi psy lib très rapproché
- Consultations spécialisées 4^{ème} (H° 2 jrs) et au 8^{ème} mois G (→ tjs pas de tt hors oxazépam 10mg SB)
- Proposition suivi psycho/psy périnat secondaire
- Proposition suivi EM

En pratique ... Mme T

- RDV CPC :
 - Mme L. 40 ans et son conjoint
 - Gr en cours 7 SA
 - Adressage médecin traitant (MG) suite arrêt Depamide® (valpromide) avec découverte grossesse
 - Plus de suivi psy depuis +ieurs mois (retraite psy lib)
- **ATCD : bipolarité**

Mme T – anamnèse bipolarité

Informations :

- Ensemble du dispositif de soin psy périnat
- Possibilité étayage/soutien à la parentalité

Préconisations :

1/ Traitement

- Venlafaxine : arrêt – compte tenu de l'absence de couverture actuelle thymoR + sympt mixtes
- Quétiapine si dégradation de l'humeur (rapport B/R)

2/ Suivi psy

- Consultations spécialisées 4^{ème} et au 8^{ème} mois G
- Proposition suivi psycho par psycho de psy périnat
- Proposition suivi EM secondaire

Bipolarité & grossesse + post-partum : quels risques ?

- **Gr & PP → pas de lune de miel / troubles de l'humeur !**
- **Bipolarité : risque de rechute : Oui +++ !**
 - > 20% durant la grossesse
 - > 50% en post-partum
- *Femmes avec TB/Gr peuvent présenter tous types d'épisodes = dépressifs, maniaques ou mixtes*

Episode Occurrence Rates of Major Affective Episodes During Pregnancy and During the Postpartum Period in 1,162 Women With Bipolar I, Bipolar II, or Major Depressive Disorder^a

D'après Florence Gressier, Anne-Laure Sutter-Dallay. *Troubles de l'humeur chez la femme : quelles recommandations avant, pendant et après la grossesse ? Troubles de l'humeur et périnatalité.* JNPN 30/06-01/07/2022. Paris

Viguera AC et al. *Episodes of mood disorders in 2,252 pregnancies and postpartum periods.* Am J Psychiatry. 2011;168(11):1179-85.

Bipolarité & grossesse + post-partum : une indication à traiter ?

Risque de
Récurrence :
+ élevé sans
traitement !

Viguera AC et al. *Am J Psychiatry*. 2007;164(12):1817-24; quiz 1923.

Viguera AC et al. *Am J Psychiatry*. 2000;157(2):179-84.

Conséquences trouble de l'humeur

MERE	BEBE
Moindre suivi de grossesse	Fausses couches spontanées
Tentative de suicide/suicide	Exposition au stress in utero
Consommation de toxiques	Diminution des mouvements fœtaux
Faible prise de poids	Prématurité
Complications grossesse (HTA, diabète ...)	Hypotrophie
Complications obstétricales	Mauvaise adaptation néonatale
Soins apportés nouveau-né moindre qualité	Troubles neuro-développement
Récurrence en post-partum	Troubles de l'attachement
	Troubles de l'humeur

Impact du cortisol maternel

- **Rôle majeur du cortisol**
- **Cortisol traverse barrière placentaire**
 - Hypercortisolémie affecte récepteurs aux glucocorticoides dans le cerveau foetal
 - Modifications épigénétiques
- **Dysrégulation de l'axe HHS**
(hypothalamo-hypophyso-surrénalien)
- **Altération du flux sanguin utérin**

Modifié d'après Kassotaki I et al. Placental CRH as a Signal of Pregnancy Adversity and Impact on Fetal Neurodevelopment. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021;12:714214.

Caractéristiques cliniques à prendre en compte pour adapter la stratégie thérapeutique chez une patiente en phase de stabilisation avec projet de grossesse ou enceinte

Trouble dépressif caractérisé

- Symptômes résiduels
- Syndrome dysphorique prémenstruel
- ATCD d'épisode thymique d'intensité sévère ou en période périnatale
- ATCD de conduites suicidaires
- ATCD familial d'épisode thymique en période périnatale ou de TBP
- Comorbidité anxieuse
- Niveau d'observance
- Préférences/refus de la patiente

Trouble bipolaire

- Type de trouble bipolaire
- Polarité prédominante maniaque/dépressive
- Cycles rapides ou épisodes mixtes
- + Autres caractéristiques trouble dépressif caractérisé

Recos périnat' AFPBN 2022/23 : quels traitements ?

Risque CRAT	Thymorégulateurs / antipsychotiques	Antidépresseurs	Précautions d'emploi - Globales (cf détail) - Test grossesse avt instauration - Brochure sur ttt prescrit
Risque élevé	Valproate / Divalproate Valpromide		Tous les 6-12mois
Risque intermédiaire ou peu de données	Lithium Carbamazépine Clozapine Halopéridol	Fluvoxamine Miansérine Tianeptine Milnacipran	Tous les 12mois
Risque absent/faible et nombreuses données	Lamotrigine Aripiprazole Olanzapine Quétiapine Risperidone/Palipéridone ECT	Citalopram/Escitalopram Fluoxétine Paroxétine Sertraline Duloxétine Venlafaxine Amitriptyline Clomipramine	Tous les 12-36mois

Quel traitement proposer ? (Recos Périnat Fr 2022#AFPBN) Femmes en âge de procréer ou durant la grossesse

Prescriptions molécules psychotropes en fonction du risque tératogène

Quelque soit la phase du trouble bipolaire ou du trouble dépressif caractérisé (phase aiguë maniaque/dépressive ou phase de stabilisation) et de l'âge

- Il est recommandé:
 - En **1^{ère} intention d'utiliser une molécule habituellement efficace et sans risque tératogène**
 - En **2^{ème} intention d'utiliser une molécule efficace à risque tératogène intermédiaire**
- Il est **non recommandé (contre-indication) d'utiliser une molécule efficace à risque tératogène élevé** quelque soit la situation clinique

Conclusions ... au-delà de la bipolarité : CPC#Psy

CRSPP @EPSAN-Brumath

« NOS RECOS »

- Proposer **+ systématiquement possible CPC aux couples** avec désir de Gr dont l'un des futurs parents présente un tr psychiatrique
- Aborder la **question de la Gr avec toute patiente** en âge de procréer
- **Programmer si possible la grossesse** (stabilité psychique au - 6 mois)
- Dépistage systématique **symptômes psychiques en période périnatale**
- Traitements psychotropes :**
 - **Dosages plasmatiques du/des ttt avt la grossesse** (C° plasm efficace avt Gr & contrôles pdt Gr)
 - **Pas arrêter brutalement** lors de la découverte de la Gr - sauf si risque tératogène majeur
 - Maintien/Arrêt : **balance B/R en CPC#Psy**

CRSPP @EPSAN-Brumath

NOTRE APPROCHE GLOBALE

- Prise en charge multidisciplinaire / réseau**
 - Suivi rapproché, **multidisciplinaire**, des soins coordonnés et gradués, pour la mère (dès la Gr), le père & BB
 - **Travail en réseau** (MT, psychiatre, équipe psypérinatalité, équipe gynéco-obstétricale de la maternité, équipe pédiatrique, PMI...)

Merci !

Centre de Ressources
et de Soins en Psychiatrie
Périnatale

CRSPP

EPSAN - I02

03 88 64 61 09

EPSAN Etablissement Public
de Santé Alsace Nord

Un acteur majeur du dispositif de santé mentale dans le Bas-Rhin

Annexes

Modifications structurelles

Remodelage dendritique

Neuroinflammation (Il-6)

↘° densité des neurones de l'hippocampe

↘° volume cortical et amygdale

↘° maturation cérébrale

CORTISOL

Neurotransmissions altérées

Dysfonctionnement GABAergique

Dysfonctionnement sérotoninergique

Réinitialisation de l'axe HHS foetal

↗° réactivité de l'axe HHS

Impact comportemental

Déficits cognitifs

Déficits émotionnels

↗° niveaux de détresse

Symptômes/troubles « internalisés »

Recos allaitement

Prescriptions molécules psychotropes en cas d'allaitement

Quelque soit la phase du trouble bipolaire ou du trouble dépressif caractérisé (phase aigue maniaque/dépressive ou phase de stabilisation)

- Il est recommandé:
 - En **1^{er} intention** d'utiliser une **molécule ne présentant aucun effet indésirable chez le nourrisson** lors de l'allaitement (L1, L2)
 - Il est **non recommandé (contre indication)** d'utiliser une **molécule ayant déjà montré l'existence d'effets indésirables chez le nourrisson** lors de l'allaitement (L4-L5)
 - **Pas de consensus pour L3** (tendance à la 3^{ème} intention)

Classification Thomas Hale	Thymorégulateurs Antipsychotiques	Antidépresseurs
L4 – L5	Valproate Lithium
L3	Aripiprazole Clozapine Haloperidol	Duloxétine Mirtazapine Milnacipran
L1 – L2	Lamotrigine Carbamazépine Olanzapine Quétiapine Risperidone	Citalopram Escitalopram Fluoxétine Paroxétine Sertraline Venlafaxine Amitriptyline Clomipramine Imipramine Fluvoxamine